

СИБИРСКАЯ ЯЗВА

ПОМНИТЕ!!!

**Источник заражения -
заболевшие или падшие животные
(крупный и мелкий рогатый скот).**



ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ "СИБИРСКАЯ ЯЗВА"

Очень опасное заразное заболевание, передающееся человеку от крупного и мелкого рогатого скота. Заражение животных происходит после поедания кормов, через укусы слепней, мухами-жигалками. Заболевание животных наступает через 1-3 дня после заражения, протекает тяжело и обычно на 2-3 сутки животное погибает.

Заражение человека чаще всего наступает от соприкосновения с больным или павшим животным, а также при соприкосновении со всеми видами продуктов, полученных от больных животных. В зависимости от того, каким путем микробы проникли в организм человека (через кожу, пищеварительный тракт, органы дыхания), болезнь проявляется в кожной, кишечной и легочной форме.

Чаше возникает заболевание людей сибирской язвой в кожной форме. От момента заражения до проявления болезни проходят 2-5 дней. На коже появляется маленькое красное пятнышко, похожее на укус насекомого, затем оно превращается в пузыrek с мутной кровянистой жидкостью. Со временем пузыrek лопается и на его месте образуется струп - сибириязвенный карбункул.

С момента появления изменений на коже у больного появляется чувство недомогания, поднимается высокая температура.

КАК ЖЕ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ?

Основная мера борьбы с распространением сибирской язвы среди людей - это ликвидация ее среди животных. Ветеринарная служба располагает надежным средством защиты животных от сибирской язвы - сибириязвенной вакциной. Все лица, по роду своей деятельности связанные с опасностью заражения сибирской язвой, допускаются к работе только после вакцинации (проведения прививок). Невосприимчивость к сибирской язве возникает у человека через 12-14 дней после прививки и сохраняется около года. Каждый должен знать, что мясо вынужденного убоя нельзя употреблять в пищу.