


ЛЕПТОСПИРОЗ

ВНИМАНИЕ!!!

**Источник заражения -
заболевшие дикие и
домашние животные.**



ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ "ЛЕПТОСПИРОЗ"

Источником заражения людей являются больные и переболевшие дикие и домашние животные (грызуны, крупный рогатый скот, свиньи, собаки). Природным резервуаром лептоспирозной инфекции являются грызуны. Заражение людей, в большинстве случаев, происходит при купании и использовании для хозяйственных нужд воды из открытых водоемов, инфицированных животными - носителями лептоспироза, за время сельскохозяйственных работ на сырых угодьях, охоте, рыбной ловле. Можно заболеть при использовании продуктов питания, инфицированных грызунами, при уходе за больными животными, при разделке туш, при употреблении молока от заболевших коров. Заражение от больного человека к здоровому не передается.

Лептоспиры, проникая в кровь, заносятся в различные органы, главным образом, в печень, почки, селезенку, где и размножаются. Проявления болезни появляются через 6-14 дней после заражения и начинаются высокой температурой до 39-40° уже в первые сутки. Больные жалуются на сильную головную боль, бессоницу, потерю аппетита, сильные мышечные боли. Может присоединиться желтуха к 3-6 дню болезни. Для лептоспироза с желтухой характерно более тяжелое течение болезни. Нередки различного рода осложнения.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ЛЕПТОСПИРОЗОМ?

Необходимо помнить:

- при поездках за город, при ловле рыбы, раков запрещается употреблять для питья, мытья овощей, фруктов сырую воду из открытых водоемов;
- нельзя купаться, ловить рыбу, раков в водоемах со сточной водой, в каналах, особенно в сбросовых, в местах водопользования скота и ниже этих мест по течению;
- при рыбной ловле, охоте следует одевать водонепроницаемую обувь;
- продукты питания следует оберегать от заражения грызунами.